

Bronsbergen



Recreatieplas en bungalowpark Bronsbergen is ontstaan ter plaatse van een zandwinplas (Gat van Roelofs) uit 1976 die in 1995 werd uitgebreid (Bronsbergermeer). De huidige recreatieve functie is er vooral sinds 2002, toen het bungalowpark Bronsbergen werd aangelegd. Momenteel is de oever van het zuidelijke en oudste van de twee plassen begroeid met bomen, terwijl op het noordelijke deel ligweides en zandstrandjes aanwezig zijn. Rond het gebied is een smalle parkachtig ingerichte strook aanwezig.

Gebiedskenmerken

Oppervlakte:	48 ha
Functie:	Recreatie en deels wonen
Jaar van ontwikkeling:	2002
Dynamiek:	Gemiddeld
Verhouding grijs/groen/blauw:	20/20/60



Karakteristieke soorten (totaal aantal waargenomen soorten NDFF: 165)

Vogels (90 waargenomen soorten)	Vleermuizen (0 waargenomen soorten)	Zoogdieren (4 waargenomen soorten)
Boerenwaluw, Brilduiker, Gele kwikstaart, Grote mantelmeeuw, Huismus, Huiswaluw, Kneu, Koekoek, Kramsvogel, Oeverloper, Slobeend, Smient, Torenavalk, Tureluur, Visdief, Zomertaling, Zwarte mees, Oeverwaluw, IJsvogel		Haas Huispitsmuis Mol Muskusrat
Amfibieën en reptielen (2 waargenomen soorten)	Vaatplanten (43 waargenomen soorten)	Vissen (7 waargenomen soorten)
Bruine kikker Gewone pad	Engelse alant Ruige weegbree Echt bitterkruid Gewone zandmuur Ruige weegbree	Baars Bittervoorn Brasem Kleine modderkruiper Snoek
Dagvlinders (11 waargenomen soorten)	Libellen (3 waargenomen soorten)	Nachtvlinders (0 waargenomen soorten)
Atalanta Dagpauwoog Icarusblauwtje Kleine vos Oranjetipje	Grote roodoogjuffer Lantaarntje Weidebeekjuffer	
Insecten (5 waargenomen soorten)	(Korst)mossen (0 waargenomen soorten)	Overige (0 waargenomen soorten)
Bruine sprinkhaan Gewoon spitskopje Greppelsprinkhaan Grote groene sabelsprinkhaan Krasser		

*in ieder geval de rode lijstsoorten worden genoemd, alsmede enkele typische soorten.

Natuurkwaliteit en bedreigingen

- + De natuurkwaliteit in het gebied wordt gevormd door de aanwezigheid van oppervlaktewater. De nabijheid van de uiterwaarde van de IJssel maakt dat de plas door veel soorten wordt bezocht.
- + De bodemomstandigheden zijn er bijzonder (van oorsprong kalkrijke rivierduin);
- + Het bungalowpark is groen ingericht met hagen als afscheidingen tussen de percelen, veel bomen en ruig begroeide oevers langs de centrale watergang.
- Het terrein is intensief in gebruik, met name in de zomerperiode. Recreatieterreinen worden meer en meer gebruikt voor festivals. Dit kan verstoring van broedvogels of rustende watervogels zorgen.
- Het gebied ligt ingesloten door hoofdwegen (N314 en N348), waardoor uitwisseling van grondgebonden soorten met stedelijke gebieden en het agrarisch buitengebied bemoeilijkt wordt.

Ontwikkelmogelijkheden

- Het recreatieve deel van de plas wordt intensief beheerd. Niet alle terreindelen worden door recreanten gebruikt om op te liggen. Hier zouden kruidenrijke stukken kunnen ontstaan, in plaats van soortenarme gazons.
 - Beheer omliggend parkachtig terrein extensiveren;
 - Waar mogelijk gefaseerd maaibeheer toepassen, plekken met overjarige vegetatie toelaten.
- Ondanks het intensieve gebruik is er voor schuwe soorten zoals de ijsvogel toch nog leefgebied. Behoud van rustige terreindelen is een te behouden waarde.

-
- Enkele delen van de oever minder toegankelijk maken voor recreanten of vissers;
 - Drijvende eilandjes maken voor rustende of broedende watervogels.
- De provinciale wegen vormen potentiële barrières voor bijvoorbeeld marters of egels, die zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied leven.
- Aanleg faunavoorzieningen aan noordzijde, aansluitend op groen/blauwe verbindingen in Zuidwijken.
 - Faunavoorziening (looprichel) langs de Vierakkerse laak onder de brug van de N314, voor de das en andere diersoorten.

CONCEPT